




SITUACIÓN DEL BROTE DE PESTE PORCINA AFRICANA EN CROACIA

(21.07.2023)

Desde el pasado 27 de junio en que Los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de Croacia notificaron los 2 primeros focos, se han notificado hasta el día 18 de julio de 2023, a través de ADIS, 59 focos de Peste Porcina Africana (PPA) en explotaciones de porcino doméstico localizadas en la región de Vukovarsko-Srijemska y en la región de Brod Posavina, regiones localizadas en la zona fronteriza con Bosnia-Herzegovina y Serbia, ambos países afectados por la enfermedad. Por otro lado, se han detectado hasta el 18 de julio dos jabalíes positivos a PCR en dos zonas un poco más al oeste, en la zona fronteriza con Bosnia-Herzegovina.



Mapa de regionalización PPA de la UE según el Reglamento de ejecución de la CE (EU) 2023/1485, con la zona restringida por focos en cerdo doméstico (zona morada) y dos zonas infectadas por focos en jabalíes (zonas amarillas) en Croacia



La mayoría de las explotaciones afectadas son explotaciones medianas o pequeñas con baja bioseguridad, pero también se han visto afectadas explotaciones grandes con a priori buena bioseguridad.

County	Municipality	Village	Establishments	Pigs	Confirmed establishments
Vukovar-Srijem	Drenovci	Drenovci	131	2896	3
		Đurići	30	821	3
		Posavski Podgajci	74	1443	20
		Rajevo Selo	39	525	15
	Gunja	Gunja	54	949	4
	Privlaka	Privlaka	182	2007	1
	Županja	Županja	90	988	2
	Nijemci	Lipovac	62	689	1
	Otok	Otok	341	4818	1
	Vrbanja	Vrbanja	133	1316	1
Babina Greda	Babina Greda	315	8265	1	
Brod-Posavina	Sikirevci	Sikirevci	167	4277	1
TOTAL			1618	28994	53

Tabla con información sobre las explotaciones afectadas hasta el 11 de julio de 2023 (SVO Croacia)

Las autoridades croatas están implementando en la zonas afectadas las medidas de control contempladas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista, que incluyen en relación con los focos en porcino doméstico la inmovilización y vaciado sanitario de las explotaciones afectadas, eliminación de cadáveres de animales matados así como eliminación de los productos susceptibles de estar contaminados, adopción zona de protección y de vigilancia alrededor de las explotaciones afectadas con restricción de movimientos, e investigación epidemiológica para tratar de identificar el origen de la infección, entre otras. Por su parte, en relación con los focos en jabalíes silvestres se ha definido la zona infectada, se están buscando cadáveres de jabalíes para conocer el alcance de la circulación, se ha prohibido la caza y cualquier actividad que disturbe a los jabalíes, y se ha aumentado la vigilancia y bioseguridad en las explotaciones porcinas.

El grupo de emergencia EUVET de la UE ha realizado la semana pasada una misión a Croacia para tratar de ayudar a las autoridades croatas en el control de la enfermedad que está teniendo una evolución muy negativa en la zona afectada, zona que tiene una alta densidad porcina y de jabalíes.

Se recuerda la importancia de aplicar unas **adecuadas medidas de bioseguridad** en las explotaciones de porcino, en el transporte animal, así como en relación con los cazadores que viajen a países afectados o de riesgo por la presencia de la enfermedad y que pudieran contribuir, involuntariamente, a la expansión de la enfermedad al regresar a nuestro país.

De igual forma, **se recuerda la gran importancia de garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de vigilancia pasiva** para detectar tempranamente la enfermedad ante una hipotética entrada en España, para lo que es vital que se comunique a los SVO cualquier indicio de la enfermedad que pudiera aparecer en



nuestros animales, tanto en las explotaciones y medios de transporte de animales, como en el medio natural en los jabalíes silvestres.

Toda la información relacionada con la enfermedad, incluidos los signos característicos, se puede encontrar en el siguiente enlace:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/peste-porcina-africana/peste_porcina_africana.aspx

Para acceder a información sobre la enfermedad en jabalíes silvestres incluyendo protocolo a seguir ante el hallazgo de jabalíes muertos en el campo se puede consultar la **guía de vigilancia sanitaria en fauna silvestre** en su apartado dedicado a la PPA:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/guiavigilanciasanitariafaunasilvestre_tcm30-511596.PDF